

Le scotch test consiste à rechercher des œufs sur la marge anale en collant un morceau de ruban adhésif aux abords de l'anus. On peut ensuite constater la présence d'œufs sur le ruban adhésif par examen microscopique.

Nom : ..... Prénom : ..... DN : .....

Date du recueil : .....

**Modalités de recueil : Le matin au lever avant la toilette et les premières selles**

- Décoller le scotch transparent de son support.
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale (bien déplier la marge anale) et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support sans faire de bulles d'air.
- Renouveler l'opération avec un second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec le nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Rapporter l'étui avec les deux lames au laboratoire

**Rem : Le prélèvement peut être réalisé au laboratoire :** se présenter au laboratoire le matin avant la toilette et avant les premières selles.

**Contexte clinique**

*Merci de remplir cette fiche et de la joindre au prélèvement*

**Le patient prend ou a pris récemment des antiparasitaires (< 10 jours) ?**  OUI  NON

Nom de l'antiparasitaire : .....

**Le patient présente des signes cliniques d'infection :**  OUI  NON

- prurit anal  OUI  NON

- eczématisation de la marge anale  OUI  NON

- vulvite œdémateuse et/ou purulente  OUI  NON

- troubles digestifs  OUI  NON (*anorexie, douleurs sourdes fosse iliaque droite, selles pâteuses ou diarrhéiques*)

**Cette analyse est réalisée en dehors de signes cliniques d'infection:**  OUI  NON

- contrôle après traitement  OUI  NON Autre : .....

**Au laboratoire** Prélèvement : conforme  **NC**

Commentaires :